

	Cannabis	Cocaïne	Opiacés	Amphétamine et ses dérivés	LSD
Modes de consommation les plus répandus	Il est surtout fumé par mélange de la forme haschich (barette) avec du tabac dans une cigarette (joint)	Voie nasale (Sniff) sous forme de chlorhydrate ou fumé par mélange avec du tabac sous forme de cocaïne base (crack)	Héroïne injectée par voie IV Morphine absorbée par voie orale ou IV après dissolution Codéine absorbée par voie orale	Comprimés absorbés par voie orale	Administration sublinguale
Effets recherchés	Sensations ébrieuses avec euphorie, apaisement, plaisir et détente Mais il provoque une diminution de la vigilance, une sédation et des hallucinations (à forte dose)	Stimulation du circuit de récompense (émotions et comportements fondamentaux) Sentiment de puissance intellectuelle et physique Indifférence à la douleur et la fatigue	L'effet recherché par l'injection IV (« flash orgasmique ») avec apaisement, euphorie, sensation d'extase est fugace (quelques dizaines de secondes) et suivi d'une phase de sédation, somnolence et sommeil.	Stimulation par : - accroissement de la vigilance, des performances, de la concentration et de la confiance en soi. - diminution de la sensation de fatigue. Modification des rapports sociaux par effet entactogène et hallucinogène.	Hallucinations , sensations de bien-être, fous rires incontrôlables
Dépendance	Psychique (+/-) selon les individus	Psychique (très intense pour la forme fumée)	Physique (+++) et psychique	Psychique (+/-) selon les produits et les individus	Absence de dépendance
Durée de détection dans les urines	2 à 3 jours chez le consommateur occasionnel 2 à 3 semaines chez le consommateur régulier	2 à 3 jours pour la benzoylecgonine	2 à 3 jours	2 à 3 jours	24 heures (à l'abri de la lumière)
Durée de détection dans le sang	2 à 3 heures pour le THC 12 à 24 heures pour le métabolite le THC-COOH	12 heures	Héroïne quelques minutes 6MAM 1 à 2 heures Morphine et codéine 12 à 15 heures	24 heures	Moins de 6 heures
Risque de surdose mortelle	Non si consommé seul	Surtout si injectée ou fumée	Avec l'héroïne surtout	Avec l'ecstasy surtout et même en faible dose	
Toxicité sur le neurone	Non	Oui	Non	Oui	Non
Risque de troubles psychiatriques	Oui	Oui (manifestations neurologiques de type psychose paranoïaque)	Non	Oui	Oui
Toxicité générale	A long terme apparition d'un syndrome amotivationnel et d'une diminution des performances intellectuelles, motrices et cognitives	Troubles du rythme cardiaque	Insuffisance respiratoire avec perte de connaissance et mort	Toxicité paradoxale L'augmentation de la confiance en soi entraîne un comportement irrationnel et une prise de risques	Risque lié à l'altération de la conscience