



Le test post-coïtal de Hühner a pour objectif d'analyser

- la présence de spermatozoïdes dans la glaire cervicale de la femme après un rapport sexuel,
- d'en apprécier la mobilité et la survie.
- Il permet également d'étudier la quantité et la qualité de la glaire.

Le prélèvement est rapide, il se déroule comme un examen gynécologique banal avec mise en place d'un spéculum.

Ce test est réalisé à un moment bien précis du cycle, généralement en période pré-ovulatoire immédiate (en fonction des courbes de température des cycles précédents, le gynécologue détermine en général la date approximative de l'ovulation, et le test sera programmé 48h avant cette date). En effet, c'est à ce moment où la glaire est la plus perméable aux spermatozoïdes.

Le prélèvement de la glaire aura lieu **entre 5 et 14 heures** après un rapport sexuel. (L'utilisation de lubrifiant pendant le rapport est à proscrire)

Recommandations pour la femme: pas de bain avant le rapport (douche possible) – pas de toilette intime.

Recommandations pour l'homme: test doit être réalisé après ***2 à 4 jours d'abstinence.***

RDV au Laboratoire: le ___ / ___ / ____ à ___ h ____.

Prélèvement à domicile sur rendez-vous: 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam Beauséjour CASABLANCA

Tél: 0522 39 32 53/84 – 06000 503 40

Whatsapp de l'accueil: 06 63 79 07 23

Fax: 0522 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma

www.labobenjelloun.ma